



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989 , Nr. 22 Bis Cod : 210215 , jud. Gorj

TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144

e-mail principal: office@dspgorj.ro,

relatii publice@dspgorj.ro; secretariat@dspgorj.ro

Pagina WEB: ” dsp-gorj.centruldecalcul.ro. “

Număr de date cu caracter personal: 35910

COMUNICAT

Având în vedere apariția în mass media și în mediul on-line a mai multor informații eronate privind cazurile de varicela aparute la nivelul județului Gorj, vă informăm următoarele :

În perioada ianuarie- februarie 2020 au fost înregistrate următoarele cazuri de varicela:

1. Grădinița cu Program Prelungit “ Lumea Copiilor “ – un număr de 25 de cazuri – a fost deschis focar în data de 10.02.2020.
2. Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Tg Jiu – 1 caz
3. Grădinița cu Program Prelungit “ Scufita Rosie “ – 4 cazuri
4. Grădinița cu Program Prelungit nr.8 – 10 cazuri
5. Cresa nr.8 Tg Jiu – 1 caz
6. Școala Generală Runcu – 10 cazuri
7. Colegiul Național Spiru Haret Tg Jiu – 2 cazuri

Totalul cazurilor înregistrate de la începutul anului este de 53 .

Direcția de Sănătate Publică Gorj a luat măsurile necesare care se impun, monitorizând în permanentă colectivitățile de copii și ținând legătura permanentă cu unitățile de învățământ , cu medicii și asistenții din cabinetele medicale școlare.

Varicela este o boală infecțioasă care se transmite prin contactul cu un bolnav purtător al virusului. Forma cea mai comună de transmitere este calea aerului, și în unele cazuri contactul cu obiecte care conțin secreții ale bolnavului.

Factorii de risc în varicela

Dacă nu ați avut niciodată varicela, există riscul de a lua boala prin contactul cu o persoană care are virusul.

Un bolnav de varicela este contagios chiar și înainte de apariția simptomelor bolii, cu 1-2 zile înainte. Eruptia apare de obicei la 2 săptămâni după contactul cu bolnavul de varicela.

Un membru al familiei cu varicela crește riscul ca, odată cu el, și ceilalți membri care nu au avut varicela să se îmbolnăvească.

Principalele masuri de preventie impotriva varicelei

Vaccinarea este principala masura prin care o persoana care nu a avut niciodata boala sa o evite.

Vaccinul poate preveni astfel imbolnavirea, dar si complicatiile care pot aparea la adulti sau la femeile insarcinate. Oportunitatea vaccinarii trebuie hotarata impreuna cu medicul de familie.

In cazul copiilor cu varicela, este foarte important ca el sa nu mearga la scoala pentru a preveni raspandirea virusului.

Masuri de preventie speciale trebuie luate in cazul persoanelor care calatoresc in afara tarii prin posibilitatea mai mare de a intra in contact cu posibili purtatori ai virusului.

Pentru a preveni suprainfectarea prin spargerea veziculelor, se recomanda o igiena corecta, prin eliminarea produselor cosmetice nerecomandate, aplicate pe veziculele sparte.

Dezinfectarea unui spatiu contaminat

Cand in scoala sau in gradinita sunt raportate cazuri de varicela, se identifica spatiile si obiectele care ar putea fi contaminate (de exemplu asternuturile copiilor care s-au imbolnavit, jucariile din clasele lor, etc) si se face dezinfectie.

- Sunt sterse suprafetele si jucariile care se preteaza cu substante dezinfectante
- Sunt spalate asternuturile, pernutele, plusurile, etc

Acasa, se spala separat hainele persoanei bolnave, se sterilizeaza obiectele comune cu dezinfectante, se separa bolnavul de alti membrii ai familiei neprotejati.

Re-intrarea in comunitate a persoanei care a fost bolnava

Reintrarea in comunitate a unei persoane care a fost bolnava de varicela este permisa doar dupa ce nu mai este contagioasa, deci dupa vindecarea tuturor veziculelor.

La copii, reintrarea in comunitate se face cu acordul medicului, care examineaza pacientul si emite avizul epidemiologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec.IVANOV CARMEN

COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL,
CONS.SUP.PITIAN ELENA