

INFLUVAC TETRA – SUSPENSIE INJECTABILA IN SERINGA PREUMPLUTA

Vaccin gripal tetravalent

Este un vaccin recomandat pentru a va proteja pe dumneavostra sau pe copilul dumneavoastră împotriva gripei și este utilizat în special la pacientii care prezintă un risc crescut de complicații determinate de gripe,

Este indicat la adulți și copii începând cu varsta de 3 ani.

Administrarea trebuie să se efectueze conform unei recomandări oficiale.

Cind vi se administrează vaccinul, sistemul imunitar (sistemul natural de apărare al organismului) va începe să producă factori de protecție (anticorpi) împotriva bolii.

Niciuna dintre componentele vaccinului nu poate să producă gripe.

Produsul începe să va protejeze împotriva celor patru tulpi ale virusurilor continute în vaccin după 2 pîna la 3 săptămâni de la injectare.

Perioada de incubatie a gripei este de cîteva zile, asadar, dacă sunteți expus(a) la gripe imediat înainte sau după vaccinare, puteți să va imbolnaviți (dar nu din cauza vaccinului).

Vaccinul nu va va protejeaza împotriva racelilor obisnuite, desă unele simptome sunt similare gripei.

Gripa este o boala care se poate răspinde rapid și este provocată de diferite tipuri de tulpi care se pot schimba în fiecare an. Din acest motiv este necesar să va vaccinati dumneavostra sau copilul în fiecare an.

Cel mai mare risc de a va imbolnăvi de gripe este în timpul lunilor reci, perioada cuprinsă între luniile octombrie și martie.

Medicul dumneavostra va poate recomanda perioada optimă de vaccinare.

2. Ce trebuie să știi înainte să vi se administreze dumneavoastră sau copilului dumneavoastră Influvac Tetra

Pentru a vă asigura că administrarea Influvac Tetra este adecvată pentru dumneavoastră sau copilul dumneavoastră, este important să spuneți medicului sau farmacistului dacă vreuna dintre situațiile de mai jos este valabilă în cazul dumneavoastră sau al copilului dumneavoastră. Dacă aveți nelămuriri, cereți medicului sau farmacistului să vi le explice.

Nu utilizați Influvac Tetra

- Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră sunteți alergici (hipersensibili) la:
 - substanțele active sau
 - la oricare dintre ingredientele Influvac Tetra (vezi punctul 6) sau
 - la oricare componentă care poate fi prezentă în cantități foarte mici, cum sunt: ouă (ovalbumină sau proteine de pui de găină), formaldehidă, bromură de cetiltrimetilamoniu, polisorbat 80 sau gentamicină (un antibiotic folosit pentru tratamentul infecțiilor bacteriene)
- Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți o boală însoțită de temperatură mare sau o infecție acută, vaccinarea trebuie amânată până când dumneavoastră sau copilul dumneavoastră v-ați vindecat.

Influvac Tetra poate fi folosit pe perioada alăptării.
Medicul dumneavoastră/farmacistul va decide dacă trebuie să vi se administreze Influvac Tetra. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor
Influvac Tetra nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacitatei de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Influvac Tetra conține sodiu și potasiu
Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic "nu conține sodiu".
Acest medicament conține potasiu mai puțin de 1 mmol (39 mg) per doză, adică practic "nu conține potasiu".

3. Cum se utilizează Influvac Tetra

Doze

La adulții se va administra o doză de 0,5 ml.

Utilizare la copii și adolescenți

Copilor cu vârstă cuprinsă între 3 ani și 17 ani li se va administra o doză de 0,5 ml.

Copilor cu vârstă mai mică de 9 ani care nu au mai fost vaccinați anterior cu un vaccin gripal sezonier: o a doua doză va fi administrată la un interval de timp de cel puțin 4 săptămâni.
Pentru copiii cu vârstă mai mică de 3 ani siguranța și eficacitatea Influvac Tetra nu au fost încă stabilite.

Mod și/sau cale(căi) de administrare

Medicul dumneavoastră vă va administra doza recomandată de vaccin prin injecție în mușchi sau profund, sub piele.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Atenționări și precauții

Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră trebuie să-i spuneți medicului dumneavoastră înainte de vaccinare dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți un răspuns imunitar deficitar (în caz de imunodeficiență sau tratament cu medicamente care afectează sistemul imunitar).

Ca urmare a administrării sau chiar înainte de orice injecție pot să apară leșin, senzație de leșin sau alte reacții asociate cu stresul. De aceea, spuneți medicului dumneavoastră sau asistentei medicale dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră ați avut acest tip de reacții la o injecție anterioară.

Medicul dumneavoastră va decide dacă dumneavoastră sau copilului dumneavoastră trebuie să vi se administreze vaccinul.

Dacă, indiferent de motiv, dumneavoastră sau copilul dumneavoastră ați efectuat o analiză de sânge la câteva zile după vaccinarea antigripală, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră acest lucru.

Acest lucru este necesar deoarece la unei pacienți vaccinați recent au fost observate rezultate false pozitive ale analizelor de sânge.

Similar altor vaccinuri, este posibil ca Influvac Tetra să nu protejeze pe deplin toate persoanele care au fost vaccinate.

Alte medicamente și Influvac Tetra

- Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă dumneavoastră sau copilului dumneavoastră vi s-au administrat recent alte vaccinuri sau ați luat alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.
- Influvac Tetra poate fi administrat în același timp cu alte vaccinuri, dar trebuie administrat în membre diferite. Trebuie remarcat faptul că reacțiile adverse pot fi mai puternice.
- Răspunsul imunitar poate fi diminuat în cazul pacienților care urmează un tratament imunosupresor, cum sunt corticosteroizii, medicamentele citotoxice sau radioterapia.

Sarcina și alăptarea

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă sunteți gravidă sau dacă credeți că sunteți gravidă.

Vaccinurile antigripale pot fi utilizate pe toată perioada sarcinii. Sunt disponibile mai multe date de siguranță referitoare la al doilea și al treilea trimestru de sarcină, comparativ cu primul trimestru; cu toate acestea, datele privind utilizarea la nivel mondial a vaccinurilor antigripale nu indică faptul că vaccinul ar avea efecte dăunătoare asupra sarcinii sau a copilului.

Foarte frecvente: care afectează mai mult de 1 din 10 persoane:

- durere de cap *
 - senzație de oboseală
 - reacție adversă locală: durere la locul injectării vaccinului
- * La vârstnici (≥ 61 ani) raportată ca frecvență

Frecvențe: afectează 1 până la 10 persoane din 100:

- transpirații
- dureri musculare (mialgii), dureri articulare (artralgii)
- stare generală de rău (maleză), frisoane
- reacții adverse locale: înroșire, umflare, tendință de învinetare (echimoză), apariție a unei zone dure (indurăție) la locul injectării vaccinului.

Mai puțin frecvențe: afectează între 1 din 1000 și 1 din 100 persoane:

- febră

Copii (cu vârstă cuprinsă între 3 ani și 17 ani):

Reacții adverse care au apărut la copii cu vârstă cuprinsă între 3 ani și 5 ani:

Foarte frecvențe: care afectează mai mult de 1 din 10 persoane:

- Iritatilitate
- Stare de oboseală
- Pierdere postei de mâncare
- Reacții locale: durere la locul vaccinării, roșeață, umflare, indurăție în jurul zonei în care vaccinul a fost injectat

Frecvențe: afectează 1 până la 10 persoane din 100:

- Transpirații
- Diaree/vârsături
- Febră
- Reacții locale: tendință de învinetare (echimoză)

Reacții adverse care au apărut la copii cu vârstă cuprinsă între 6 ani și 17 ani:

Foarte frecvențe: care afectează mai mult de 1 din 10 persoane:

- Dureri de cap
- Simptome gastrointestinale
- Dureri musculare (mialgie)
- Oboseală, stare de rău general (malaise)
- Reacții locale: durere la locul vaccinării, roșeață, umflare, indurăție în jurul zonei în care vaccinul a fost injectat

Frecvențe: afectează 1 până la 10 persoane din 100:

- Transpirații
- Dureri ale articulațiilor (artralgie)
- Febră
- Frisoane
- Reacții locale: tendință de învinetare (echimoză)

La toate grupele de vîrstă, majoritatea reacțiilor adverse au fost înregistrate în cadrul primelor 3 zile după vaccinare și s-au remis spontan la 1 zi până la 3 zile după debut. Intensitatea acestor reacții adverse a fost în general ușoară.