

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică Gorj

Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 Bis Cod : 210215, jud. Gorj
TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144
e-mail principal :: office@dspgorj.ro
e-mail biroul relatii publice :: relatii publice@dspgorj.ro
secretariat :: secretariat@dspgorj.ro
pagina WEB :: „ http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro”
Număr de date cu caracter personal: 35910

Nr. 459 din 17.10. 2019
Comp. Suprav./Control Boli Transmisibile
Cod C4

C a t r e,
TOTI MEDICII DE FAMILIE

Avand in vedere adresa MS nr.15598/11.10.2019 inregistrata la DSP Gorj cu nr.7304/14.10.2019 va comunicam ca, conform Comitetului de Urgenta IHR din data de 16.09.2019 OMS extinde USP II (Urgenta de Sanatate Publica de Importanta Internationala) privind pericolul de raspandire a virusului polio salbatic (WPV) si/sau derivat din vaccin (cVDPV), datorita **numarului in crestere de cazuri cu WPV si cu cVDPV fata de anul anterior. Riscul de transmitere internationala cu WPV este mai mare decat cel de la declararea USP II privind virusurile polio din 2014.** Situatia actuala necesita eforturi neingradite si utilizarea tuturor instrumentelor disponibile, pentru a atinge eradicarea, prin intarirea vaccinarii de rutina si a prevenirii izbucnirii focarelor prin implementarea unor campanii suplimentare de vaccinare de inalta calitate in zone cu risc crescut cunoscut, cât si vaccinarea calatorilor pentru tarile infectate.

Se vor mentine aceleasi masuri precizate anterior (vaccinarea copiilor, intarirea supravegherii PAF, raportarea de laborator).

La aceasta data erau tari infectate cu WPV* (*Afganistan, Pakistan si Nigeria*) si tari infectate cu cVDPV1 (*cVDPV1: Indonezia si Papua Noua Guinee, cVDPV2: Angola, Benin, Cameroon, Republica Central Africana, China, Republica Democrata Congo, Etiopia, Ghana, Mozambique, Niger, Nigeria, Filipine, Somalia, cVDPV3: Somalia*).

Ca urmare a acestei decizii, masurile luate in ceea ce priveste vaccinarea persoanelor care calatoresc din/spre tarile afectate de circulatia virusurilor polio va transmitem urmatoarele informatii:

1. **vaccinarea obligatorie antipolio pentru persoanele care calatoresc DIN si SPRE tarile mai sus mentionate infectate cu WPV, cVDPV1 si cVDPV3.** Pentru cetatenii care nu au fost vaccinati antipolio in ultimele 12 luni vaccinarea se va face cu 4 saptamani inaintea calatoriei sau in cazuri de urgenta, chiar inaintea acesteia. Vaccinarea va fi consemnata in certificatul international de vaccinari si va insoti documentele de calatorie.

Aceste persoane pot sa nu aiba dreptul sa parasca teritoriul acestor tari indiferent de punctual de frontiera (rutier, naval, aerian) fara documentele prin care se atesta vaccinarea antipolio si autoritatile lor de granite au dreptul sa interzica plecarea. Pentru evitarea acestor situatii, cetatenilor din tarile respective care solicita viza pentru Romania li se va cere certificatul de vaccinari internationale pe care este notificata vaccinarea antipolio.

2. **vaccinarea antipolio recomandata pentru persoanele care calatoresc DIN si SPRE tarile mai sus mentionate infectate cu cVDPV2** cu 4 saptamani inaintea calatoriei si care nu au fost vaccinate antipolio in ultimele 12 luni sau in cazuri de urgenta chiar inaintea plecarii. Vaccinarea va fi consemnata in certificatul international de vaccinari si va insoti documentele de calatorie.

- **In Republica Islamica Iran a fost depistat WPV1 intr-o proba de mediu,** recoltata in luna aprilie 2019, dintr-o zona la vecinatate cu Pakistan si Afganistan. Nu au fost confirmate cazuri clinice cu WPV.

OMS atrage atentia asupra vulnerabilitatii importului de virus polio. Exista state care nu mai sunt infectate cu virusuri polio (salbatic si derivat), dar raman vulnerabile pentru raspandirea cu WPV/emergenta cu cVDPV in special in sub-regiunea lacului Ciad, ca si pentru tarile invecinate cu cele amintite mai sus cum ar fi Ciad, Kenya, dar si Siria. Acestea trebuie sa intensifice eforturile de vaccinare a populatiilor mobile transfrontalier, refugiati si grupuri populationale la risc. Pentru aceste state se poate mentine recomandarea de vaccinare antipolio cu 4 saptamani inaintea calatoriei pentru calatorii care nu au fost vaccinati antipolio in ultimele 12 luni sau in cazuri de urgenta chiar inaintea plecarii.

Lista tarilor pentru care se cere vaccinarea antipolio se actualizeaza periodic de catre OMS dupa primirea rapoartelor din tarile respective.

DIRECTOR EXECUTIV

MOGOS VICTORIA
INTELESA
SANA
SANA

COMP.SUPRAVEGHERE SI CONTROL
BOLI TRANSMISIBILE
DR.PANDURA EBENA